


# Avertissements agricoles

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-8-86108511

ISSN 0767 5542

ILE DE FRANCE



Ministère de l'Agriculture  
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
47, Rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL.  
tél : 42/87/76/71.



PUBLICATION PERIODIQUE CPP N° 536 A D  
Abonnement annuel : 140 F  
Régisseur des Recettes : D.D.A.  
C.C.P. 9063 96 U PARIS .

EDITION GRANDES CULTURES

BULLETIN N°326 - 21 AOUT 1986 - ENVOI N° 16 -

## COLZA

### DESHERBAGE :

La technique de base est l'utilisation de desherbants au moment du semis (pré-semis ou post-semis - pré-levée du colza).


- Pas de nouveaux produits
- Une orientation vers des programmes de desherbage sélectifs et efficaces en cas de problèmes capselle.

Les associations suivantes complètent les possibilités de lutte contre la capselle sans problème de phytotoxicité. Les résultats obtenus doivent être confirmés pour d'autres années.



Pré-semis	Post-semis	Post-levée "Cotylédons étalés-lère feuille pointante du colza
TREFLAN - 2 l DEVRIOL - 2 l	+ BUTISAN - 1,5 l + BUTISAN - 1,5 l BUTISAN - 1,5 l	+ BUTISAN - 1,5 l



CAPSELLE



PLANTULES



P 23




# Les herbicides utilisables :

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	Observations
PRE - SEMIS	diallate	AVADEx	3,5 à 4 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporation immédiate après application</li> <li>Actif uniquement sur graminées</li> <li>Dose de 4 l si folle-avoine et repousses céréales</li> </ul>
	trifluraline	Nombreuses spécialités dont TREFLAN	2,5 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporation immédiate après épandage</li> <li>Actif sur graminées, sauf repousses de céréales</li> <li>Actif sur dicotylédones</li> </ul>
	napropamide	DEVRIOL FL	2,2 à 2,8 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporation superficielle dans les 2 jours (sauf si pluie importantes)</li> <li>Actif sur graminées : sauf folle-avoine, repousses céréales</li> <li>Actif sur dicotylédones : dont GAILLETS, MATRICAIRES</li> <li>La dose de 2,8 l est une dose maximum à n'utiliser qu'en sol argileux (+ 25 % argile) (risque phytotoxicité sur la culture suivante)</li> </ul>
	nitralin + napropamide	ZULAN FULTON	2,5 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporation superficielle dans les 2 jours</li> <li>Actif sur graminées : (proche de napropamide)</li> <li>Actif sur dicotylédones dont MATRICAIRES</li> </ul>
PRE-SEMIS OU PRE-LEVÉE	tébutam	COMODOR	4 à 5 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>En pré-semis, incorporation uniquement si sol pierreux</li> <li>Actif sur graminées : 5 l en pré-semis si risque repousses céréales</li> <li>Actif sur dicotylédones</li> </ul>
PRE - LEVÉE	dimétachlore	TERIDOX	2 à 3 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risque phytotoxicité (surtout en terres légères) utiliser 2 l</li> <li>Actif sur graminées sauf folle-avoine, repousses céréales</li> <li>Actif sur dicotylédones dont MATRICAIRES, CAPSELLES</li> </ul>
	métazachlore	BUTISAN S	2,5 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>A n'utiliser qu'en conditions de semis favorables (préparation de sol, date et profondeur de semis)</li> <li>Utilisation préférable immédiatement après le semis : possible jusqu'à 3 jours après</li> <li>Actif sur graminées sauf repousses céréales et folle-avoine</li> <li>Actif sur nombreuses dicotylédones dont MATRICAIRES, CAPSELLES</li> </ul>
POST-LEVÉE PRECOCE	métazachlore	BUTISAN S	3 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>A utiliser dès les stade "cotylédons étalés-1ère feuille pointante du colza"</li> <li>La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles</li> </ul>

# RAVAGEURS DU COLZA

## Cherchez-les au bon moment...




## ... avec la bonne méthode...

### Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- **Mise en place des cuvettes :** dès le semis, ou au plus tard à la levée dès les premiers réchauffements ; les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza ; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle.

Jusqu'au stade B<sub>2</sub>, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur.

**Attention !** Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- **Surveillance :** 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- **Insectes capturés :** grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

### L'observation des plantes

- **Observez 50 plantes** au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- **Insectes :** grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

## ... et comptez-les



# Avant de traiter, vérifiez si le compte est bon !

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"
Limace	dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées	
Puceron cendré	– automne 1 plante/5 colonisée – de C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m <sup>2</sup>	
Charançon du bourgeon terminal		notez les premières captures ; intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3
Gros charançon de la tige	1 ponte/plante entre les stades C1 et T20	vous indique les premières arrivées vous pouvez alors aller observer
Meligèthe	– stades boutons accolés à D1 : 1 insecte par inflorescence – stades boutons séparés à E : 2 ou 3 insectes	
Charançon des siliques	stades boutons accolés à G4 : 1 insecte/plante	

## Les produits de traitement

### • Contre les limaces

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m<sup>2</sup>)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 à 5 kg/ha selon les spécialités commerciales)  
métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)

### • Contre les insectes

Au semis		De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Puceron
9 kg				Benfuracarbe	Oncol 5 G				
9 kg	9 kg			Carbofuran	Curater, Delex				
12 kg				Furathiocarbe	Deltanet				
10 kg				Terbuphos	Counter plus, Counter 2 G				
9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G				
		0,15 l 0,1 l		Alphaméthrine	Fastac Fastac 10	0,15 l	0,2 l 0,1 l	0,2 l 0,1 l	
				Bromophos	Nexion 25, Rhodianex, } Sovinexion 25 Nexion 40		2 l 1,4 l	2 l	2 l
				Bromophos Méthyl	Nexion EC 40		1,4 l		
		0,3 l	0,3 l	Cyfluthrine	Baythroid		0,2 l		
		0,15 l		lambda Cyhalothrine	Karate	0,1 l	0,1 l	0,1 l	
		0,25 l 25 g ma/ha		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 l	0,25 l 20 g ma/ha	0,25 l	
		0,3 l		Deltaméthrine	Décis Décis Flow	0,3 l 0,3 l	0,2 l 0,2 l	0,2 l	
				Dialiphos	Torak FD, Torak FBC		1,25 l	1,25 l	
		250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités	400 g ma/ha	250 g ma/ha	600 g ma/ha	
		0,5 l		Fenvalérate	Sumicidin 10		0,4 l	0,4 l	
		0,2 l		Fluvalinate	Mavrik		0,2 l		
		200 g ma/ha		Lindane	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		1,7 l		Lindane huileux	Lindex huileux, Tula 520 huileux	2,5 l	1,7 l		
		750 g ma/ha		Malathion	Nombreuses spécialités		750 g ma/ha		
		1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		
		200 g ma/ha		Parathion Ethyl	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion Méthyl	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
				Phosalone	Zolone Flo Nombreuses spécialités		1000 g ma/ha	2,5 l 1200 g ma/ha	1,2 l
				Pyrimicarbe	Pirimor, Pirimor G				0,5 kg
				Endosulfan + Thiométon	Serk				1,5 l
		1 l		Lindane + Parathion Ethyl	Sopragam	1,5 l	1 l		
		0,75 l		Parathion Méthyl + Phosalone	Fortène	1,5 l	0,75 l		

(1) Doses en l ou kg de produit commercial par ha.

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière active la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.